

Može li se liječiti infekcija uzrokovana bakterijom *Mycoplasma genitalium*?

DA. Liječi se antibioticima koje će vam propisati vaš ginekolog ili liječnik obiteljske medicine.

Treba li se istovremeno liječiti moj partner/ica?


DA. Vrlo je važno obavijestiti svojeg partnera/icu da vam je dijagnosticirana ova infekcija kako bi se istovremeno liječio/la. Na taj način sprječavate ponovnu infekciju.



Mycoplasma genitalium test značajan je napredak u dijagnostici i liječenju infekcija spolno-mokraćnog sustava oba spola, jer se pravovremenim otkrivanjem i liječenjem ove infekcije sprječavaju teži oblici bolesti koji mogu ostaviti trajne posljedice na reproduktivno zdravlje.

Služba za javno zdravstvo
Centar za reproduktivno zdravlje
Tel: 01 46 96 334


Služba za kliničku mikrobiologiju
Odjel za molekularnu dijagnostiku
Tel: 01 46 96 303



10000 Zagreb, Mirogojska cesta 16
www.stampar.hr

Najnovija pretraga kod sumnje na spolno-prenosivu infekciju izazvanu bakterijom *Mycoplasma genitalium* od sada dostupna i u Hrvatskoj!

Testirajte se na spolno-prenosivu infekciju



NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO
DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Što je *Mycoplasma genitalium*?

To je mala bakterija koja može zaraziti spolno-mokraćni sustav. U žena uzrokuje upalu mokraćne cijevi i vrata maternice koja se, ako se ne liječi, može proširiti (npr. na sluznicu maternice i jajovode) i uzrokovati tešku infekciju - upalnu bolest zdjelice. Kod muškaraca najčešće uzrokuje upalu mokraćne cijevi (uretritis) koja često prelazi u kroničan oblik.

Koji su znaci infekcije?

Vrlo često ljudi nemaju nikakve smetnje, te je bez pretrage vrlo teško posumnjati na ovu infekciju. Mogu se javiti znakovi upale kao što su peckanje i neugoda pri mokrenju, sluzavi i/ili gnojni iscjedak iz spolovila, nelagoda i bol za vrijeme spolnog odnosa.


Kako se infekcija prenosi?

To je klasična spolno prenosiva bolest. Infekcija se prenosi tijekom nezaštićenog vaginalnog, analnog i oralnog spolnog odnosa.

Koje su komplikacije neprepoznate i neliječene infekcije?

Neliječena infekcija u žena povezuje se s upalnom bolesti zdjelice, čije su moguće posljedice izvanmaternična trudnoća i neplodnost. U muškaraca ako se ne liječe ta se bakterija može iz mokraćne cijevi širiti dalje pa se može razviti kronična upala prostate.

Posebno je važno da osobe koje su negativne na druge spolno prenosive uzročnike kao što su *Neisseria gonorrhoeae* i *Chlamydia trachomatis*, a imaju simptome infekcije spolno-mokraćnog sustava naprave test na bakteriju *Mycoplasma genitalium*!



Kako mogu saznati jesam li zaražen/a?

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ molekularnom metodom (PCR) dokazuje se *Mycoplasma genitalium* u uzorcima.

Pogodni uzorci su: prvi mlaz mokraće za žene i muškarce. Nadalje, za žene je pogodan uzorak obriska vrata maternice koji uzima ginekolog, a za muškarce obrisak uretre koji se uzima u ambulanti Nastavnog Zavoda „Dr. Andrija Štampar“.

Zašto se do sada nisam testirao/la na ovu infekciju?

Ova bakteriju nije moguće uzgojiti na uobičajen način u laboratoriju. Tek se u najnovije vrijeme primjenom molekularnih metoda *Mycoplasma genitalium* uspješno dokazuje. Do nedavno, ova pretraga nije bila dostupna u Hrvatskoj, a sada je upravo zbog svoje važnosti uvedena u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Mogu li osobe koje su zaražene bakterijom *Chlamydia trachomatis* istovremeno biti zaražene i bakterijom *Mycoplasma genitalium*?

DA. Zbog istog načina prijenosa, osobe pozitivne na *Chlamydia trachomatis* češće imaju i bakteriju *Mycoplasma genitalium*.