


Infekcija uzrokovana respiratornim sincicijskim virusom - RSV infekcija



RSV je uobičajeni **uzročnik prehlade i kašlja** u djece i odraslih.



Većina slučajeva se pojavljuje **u zimskim mjesecima** (sporadično tijekom cijele godine).



RSV se **prenosi kapljičnim putem** i kontaktom sa zaraženom osobom.

4

RSV na površinama (igračke, stol) može preživjeti **od 4 do 7 sati**.

7



Period od kontakta s virusom do pojave prvih znakova bolesti je **od 3 do 5 dana**.

U većine uzrokuje **blagu bolest** dišnih puteva.

Najčešći simptomi bolesti:



curenje i/ili začepljenost


nosa



kihanje

smanjen apetit

kašalj



povišena temperatura

Liječenje je simptomatsko (snižavati povišenu temperaturu, djetetu dati puno tekućine).

!!! Kada se javiti vašem pedijatru? - kada *dijete teško diše, odbija piti tekućinu ili mu se simptomi pogoršavaju !!!*



RSV je **najčešći uzročnik upale pluća i bronhiolitisa** u djece do godinu dana.

Moguće je ponovno se zaraziti i nakon preboljenja RSV infekcije. Većinom su simptomi lagani poput prehlade, ali mogu biti ozbiljni u starijih osoba ili u djece s kroničnim bolestima.

Za sada ne postoji cjepivo protiv RSV-a.

Kako zaštiti svoje dijete?



Izbjegavajte druženja vašeg djeteta s djecom koja imaju simptome akutne respiratorne bolesti.




Učite djecu da Peru ruke


SAPUNOM i VODOM u trajanju od najmanje 20 sekundi.



Učite djecu da laktom ili maramicom pokriju nos i usta prilikom kihanja kako bi smanjili širenje virusa.



Naučite djecu da izbjegavaju diranje lica prljavim rukama.



Redovito čistite i dezinficirajte površine u kućanstvu.



Neka vaše dijete ostane kod kuće ukoliko razvije simptome akutne respiratorne bolesti kako bismo spriječili daljnje širenje bolesti.